

CONSIGLI UTILI

La prevenzione delle infezioni, e in modo particolare della peritonite, dipende dall'attenzione e dalla precisione con cui il paziente attua le procedure che gli vengono insegnate durante l'addestramento.

Il lavaggio delle mani e l'uso corretto delle mascherine costituiscono le basi di questa prevenzione.

Inoltre:

- Avvertire il personale nel caso in cui compaiano segni e sintomi come dolore, rossore, gonfiore, secrezione in sede del catetere poiché potrebbero essere indici di infezione
- Rottura del set e disconnessioni accidentali sono eventi rari, ma potenzialmente gravi. Se si dovessero verificare contattare subito il centro
- Evitare che il catetere venga maneggiato da personale che non lavora nel reparto di dialisi poiché la gestione prevede una specifica competenza.

****Questa brochure è stata condivisa ed approvata dall'Associazione dei Dializzati, Uremici, Nefrotrapiantati A.N.E.D.*

Nefrologia e Dialisi

Sede:

Ospedali Riuniti Padova Sud, Via Albere n°30 - Monselice. Il servizio di emodialisi è situato al piano terra del blocco C1.

Contatti:

Sala Dialisi: 0429 715399

Ambulatorio Peritoneale: 0429 715397

Orari di apertura del Centro:

Dal lunedì al sabato 7.00 - 19.00.

Orari di ricevimento pazienti e familiari:

Dal lunedì al sabato 9.00 - 11.00. Si possono concordare telefonicamente dei colloqui con il medico di turno.

Per maggiori informazioni vai alla pagina della Nefrologia e Dialisi degli Ospedali Riuniti Padova Sud sul sito: www.aulss6.veneto.it

Tutela

Le segnalazioni e i suggerimenti degli utenti sono considerate un contributo al miglioramento dei servizi.

Possono essere comunicate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico verbalmente o tramite mail: urp@aulss6.veneto.it

Numero Verde

800 201 301 da lunedì a venerdì 8.30 - 14.00


I valori e le credenze dei pazienti vengono rispettati nel contesto dell'analisi dei fabbisogni clinico-assistenziali.



Ospedali Riuniti Padova Sud
“Madre Teresa di Calcutta”


U.O.C. di Nefrologia e Dialisi
Direttore Dr. Giuseppe Mennella

Catetere per dialisi peritoneale



CATETERE PER DIALISI PERITONEALE

Il catetere per dialisi peritoneale è un piccolo tubicino che viene inserito chirurgicamente nella cavità addominale al fine di permettere l'ingresso e l'uscita di un liquido dializzante (depurante) dalla cavità stessa. Il catetere è fatto di silicone e col tempo si fissa ai tessuti sottocutanei del paziente grazie alle due cuffie di cui è dotato.



POST-OPERATORIO

Fino al momento dell'addestramento il catetere viene gestito dagli infermieri del centro, che eseguono lavaggi e medicazioni due volte la settimana.

- Non fare la doccia per i primi due mesi, lavarsi a pezzi, lavare i capelli separatamente
- Non sollevare pesi superiori a 5 kg
- Per i primi 2 giorni non dormire dal lato del catetere
- Non indossare pantaloni con elastici stretti o cinture, preferire le bretelle

Il paziente potrà acquistare la cintura per contenere il catetere peritoneale online

ADDESTRAMENTO

Generalmente dopo 1 mese dal posizionamento del catetere, il personale infermieristico insegna al paziente, o al suo care-giver, come eseguire gli scambi dialitici e la medicazione. Il periodo di addestramento dura generalmente 4 giorni, o fino a quando il paziente è autonomo.

Questi i punti fondamentali:

- **Medicazione emergenza cutanea (exit):** viene fornita una guida alla medicazione. Si consiglia di effettuare la medicazione due volte la settimana e ripeterla dopo aver fatto la doccia e qualora non si presenti integra.
- **Scambi dialitici:** viene illustrata, anche tramite schede riassuntive consegnate al paziente, la tecnica dialitica (manuale o automatizzata) e l'importanza delle fasi di connessione e disconnessione del catetere peritoneale. Particolare attenzione viene posta all'igiene delle mani e dell'ambiente.
- **Gestione delle possibili complicanze** (peritonite, infezione exit, ecc.)

IGIENE PERSONALE

- Preferire la doccia al bagno in vasca
- La doccia non può essere effettuata prima di due mesi dal posizionamento del catetere
- L'ideale sarebbe fare la doccia almeno 2 volte a settimana
- Dopo i primi 2 mesi si può fare la doccia rimuovendo la medicazione prima di entrare
- Prima di bagnarsi far scorrere l'acqua per qualche minuto
- Lavare i capelli separatamente
- Utilizzare il sapone disinfettante per detergere l'emergenza cutanea del catetere e risciacquare delicatamente
- Non stratonare il catetere
- Asciugare l'emergenza con garze sterili
- Prima di asciugarsi con l'accappatoio posizionare delle garze sterili a protezione dell'emergenza cutanea
- Rinnovare la medicazione.