

## VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

È raccomandata e gratuita per:

<b>Persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all'influenza</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza</li> <li>- Persone dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da malattie croniche o patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza: <ul style="list-style-type: none"> <li>- malattie polmonari</li> <li>- malattie cardio-circolatorie</li> <li>- diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi obesi)</li> <li>- malattie renali</li> <li>- malattie del sangue</li> <li>- malattie dell'intestino</li> <li>- epatopatie</li> <li>- tumori</li> <li>- malattie che comportano immunodepressione, inclusa immunodepressione indotta da farmaci</li> <li>- malattie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici</li> <li>- malattie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie ( ad esempio malattie neuromuscolari)</li> </ul> </li> <li>- Persone di età pari o superiore ai 65 anni</li> <li>- Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale</li> <li>- Persone di qualunque età ricoverate presso strutture per lungodegenti</li> </ul>
<b>Persone che possono trasmettere l'infezione a persone ad alto rischio di complicanze</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Medici e personale sanitario</li> <li>- Familiari, personale di assistenza, contatti (adulti e bambini) di persone ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato)</li> </ul>
<b>Addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forze di Polizia</li> <li>- Vigili del fuoco</li> <li>- Polizia Locale</li> <li>- Personale degli Asili Nido e delle Scuole</li> <li>- Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni</li> <li>- Addetti ai trasporti pubblici</li> </ul>
<b>Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allevatori</li> <li>- Addetti all'attività di allevamento</li> <li>- Addetti al trasporto di animali</li> <li>- Macellatori e vaccinatori</li> <li>- Veterinari pubblici e libero-professionisti</li> </ul>
<b>Altre categorie</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Donatori di sangue</li> </ul>

**UNA SOLA DOSE DI VACCINO È SUFFICIENTE PER TUTTE LE ETÀ.**

Si raccomandano 2 dosi distanziate di almeno 4 settimane solo per i bambini al di sotto dei 9 anni mai vaccinati in precedenza.