



FEBBRE GIALLA

Consigli ai viaggiatori internazionali diretti o provenienti dal Brasile o da altri Paesi infetti

La febbre gialla è una malattia acuta virale trasmessa alle persone dalle zanzare.

Attualmente è in corso una grave epidemia di febbre gialla in Brasile, che si è diffusa anche a stati precedentemente non considerati a rischio e a città densamente popolate.

Questa malattia è inoltre endemica in molti Paesi africani e dell'America centrale e meridionale.

**LA VACCINAZIONE E' LA MISURA DI PREVENZIONE PIU' EFFICACE:
deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della partenza e
conferisce un'immunità che dura per tutta la vita**

PRIMA DI PARTIRE

- Si raccomanda di consultare il proprio medico curante

- Rivolgersi a un centro di vaccinazione autorizzato, il cui elenco è disponibile al seguente link:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=765&area=Malattie%20infettive&menu=viaggiatori&=tab2

Questi centri sono gli unici autorizzati a rilasciare un certificato di vaccinazione contro la febbre gialla valido in tutto il mondo.

E' possibile consultare la guida interattiva dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla vaccinazione contro la febbre gialla nel mondo al seguente link:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=655&area=Malattie%20infettive&menu=viaggiatori

AL VOSTRO ARRIVO IN BRASILE O IN ALTRE AREE GEOGRAFICHE INFETTE

- Utilizzare i repellenti cutanei e altre misure di protezione individuale contro le punture di zanzara (indossare abiti di colore chiaro a maniche lunghe e pantaloni lunghi, soggiornare in ambienti con aria condizionata o con zanzariere alle porte e finestre, utilizzare prodotti antizanzare negli ambienti chiusi) al chiuso e all'aperto, soprattutto dall'alba al tramonto

***Per qualsiasi necessità contattare
la Vostra Ambasciata o il Vostro Consolato***

AL VOSTRO RITORNO IN ITALIA

se nella PRIMA SETTIMANA che segue il vostro ritorno si dovessero presentare sintomi compatibili con la febbre gialla, quali: febbre, brividi, dolori muscolari, mal di testa, perdita di appetito, nausea, vomito, colorito giallastro (ittero)

a scopo precauzionale

contattate il vostro medico di fiducia, riferendo del vostro recente viaggio

Ulteriori raccomandazioni, informazioni e aggiornamenti sono disponibili alle pagine web dedicate alla febbre gialla sul portale del Ministero della Salute:

[http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=214&area=Malattie trasmesse da vettori](http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=214&area=Malattie%20trasmesse%20da%20vettori)
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3264



Directorate General of Prevention

YELLOW FEVER

Travel advice for travellers going to or returning from Brazil and other affected Countries

Yellow fever is an acute viral disease transmitted to people through the bite of infected mosquitoes.

At present, a vast outbreak of Yellow fever is affecting Brazil where it is spreading to new areas previously not considered at-risk for Yellow fever, and to densely populated cities.

In addition, Yellow fever is endemic in many Countries of Africa and Central and South Americas.

YELLOW FEVER VACCINE IS THE MOST EFFECTIVE PREVENTIVE MEASURE:

Vaccination should be done at least 10 days before travelling and provides life-lasting protection

BEFORE TRAVELLING

- Consult your physician

• Visit an authorized vaccination center, whose list is available at the following link:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=765&area=Malattie%20infettive&menu=viaggiatori&=tab2

These centers are the only ones authorized to issue an international certificate for yellow fever vaccination, recognized all over the world.

• It is possible to consult the interactive guide of the World Health Organization on Yellow fever vaccination in the world:

<http://www.who.int/ith/en/>

AT YOUR ARRIVAL IN BRAZIL OR IN OTHER AFFECTED COUNTRIES

- avoid mosquito's bites by using insect repellents and adopting other individual protective measures (wear light colored long-sleeved shirts and trousers stay in screened or air-conditioned rooms) indoor and outdoor, especially during mid-morning and late afternoon to dusk;

**For any need please contact
your Embassy or your Consulate**

WHEN YOU COME BACK TO ITALY

If you develop Yellow fever symptoms within the FIRST WEEK after your return, such as: fever, chills, muscle pain, headache, nausea and vomiting, jaundice

on a precaution basis

**seek the advice of your physician informing
him/her about your recent travel**

Further recommendations, information and epidemiological updates are available on the WHO website:

<http://www.who.int/csr/don/en/>

<http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/en/>