



COLONSCOPIA

Gent.le Signora/e _____

Le è stata prenotata una colonscopia per il giorno _____ alle ore _____ presso il Servizio di Gastroenterologia dell'ospedale di _____.

L'esame ha una durata variabile. Non possiamo perciò garantirle la puntualità nell'orario prenotato.

COME PREPARARSI ALL'ESAME

Affinché l'esame sia utile alla diagnosi è necessario che l'intestino sia perfettamente pulito. Questo richiede una accurata preparazione. La preghiamo perciò di seguire scrupolosamente le seguenti istruzioni: Nei tre giorni precedenti l'esame eviti assolutamente di mangiare frutta e verdura di qualsiasi tipo e latticini. Nel caso l'intestino sia abitualmente stitico, nei tre giorni precedenti l'esame le suggeriamo di assumere dei lassativi.

Se effettua l'indagine:

– **di giorno:** verso le ore 18.00 del giorno che precede l'esame, sciolga due buste di SELG ESSE (o 4 bustine di ISOCOLAN da 34.8) in due litri di acqua e beva il preparato in meno di due ore (una tazza ogni 10 minuti). Dopo l'ingestione del preparato seguiranno scariche di feci acquose sempre più frequenti fino a che si emetterà acqua più o meno pulita. La sera precedente l'esame si limiti a bevande liquide chiare zuccherate.

La mattina dell'esame ripeta l'assunzione di SELG ESSE o ISOCOLAN come sopra descritto 5 ORE

PRIMA DELL'INDAGINE.

– **di sera** (e cioè dopo le 20.00): verso le ore 9.00 del giorno dell'esame, sciolga 2 buste di SELG ESSE (o 4 bustine di ISOCOLAN da 34.8) in due litri di acqua e beva il preparato in meno di due ore (una tazza ogni 10 minuti). Dopo l'ingestione del preparato seguiranno scariche di feci acquose sempre più frequenti fino a che si emetterà acqua più o meno pulita. A pranzo si limiti a bevande liquide chiare zuccherine.

Alle ore 14.00 ripeta l'assunzione di ISOCOLAN o SELG come già descritto.

Durante la preparazione e prima dell'indagine è opportuno che beva qualche bevanda zuccherata (the, tisana o camomilla).

Può assumere la terapia per l'ipertensione e per le malattie cardiovascolari.

Se è in terapia con anticoagulanti, questi vanno sospesi 5 giorni prima dell'indagine nel caso di Coumadin o Sintrom, 48 ore prima nel caso dei nuovi anticoagulanti orali. Concordi con il Medico curante l'eventuale somministrazione di eparina in sostituzione. Nel caso di Coumadin o Sintrom, esegua un PT e INR il giorno precedente l'indagine, e porti con sé il risultato.

Se assume antiaggreganti piastrinici: Ticlopidina, Clopidogrel, ASA (aspirina e simili): concordi con il medico curante di sospendere la terapia sette giorni prima dell'esame e il giorno successivo all'esame.

Vi è indicazione ad effettuare **profilassi antibiotica dell'endocardite batterica** in caso di: presenza di protesi valvolari, pregresse endocarditi, cardiopatie cianogene congenite, shunt sistemico-polmonare.

RACCOMANDAZIONI

Il giorno dell'esame si presenti con l'impegnativa, la tessera sanitaria e il **consenso informato firmato**. Porti i referti di eventuali esami endoscopici, di laboratorio e radiologici eseguiti precedentemente.

Comunichi un'eventuale disdetta con un anticipo di cinque giorni lavorativi (telefono: 049 8285309; mail: disdetta.15@aulss6.veneto.it; fax: 049 9424507). **La mancata disdetta comporta il pagamento dell'intera tariffa della prestazione anche se è esente.**

Presidio Ospedaliero di Camposampiero U.O.C. GASTROENTEROLOGIA Direttore dott. Diego Fregonese

Camposampiero Tel (+39) 049 9324480 – Fax (+39) 049 9324844 – endogastro_csp@aulss6.veneto.it

Cittadella Tel (+39) 049 9424835 – Fax (+39) 049 9424843